

Peritraumatic Distress Inventory – Child (PDI-C)

Bui et al. (2011) ©2011

Traduction française et validation par Bui et al. (2011)

Nom : _____ Prénom : _____ Date de passation : _____

Complète s'il te plaît les phrases qui suivent en cochant la case qui correspond le mieux à ce que tu as ressenti pendant et immédiatement après l'événement qui t'a amené à l'hôpital. Si un énoncé ne s'applique pas à ton expérience de l'événement, alors coche la réponse « Pas du tout vrai ».

	Pas du tout vrai	Un peu vrai	Plutôt vrai	Très vrai	Extrêmement vrai
1. Je me sentais impuissant(e), dépassé(e)	0	1	2	3	4
2. Je ressentais de la tristesse et du chagrin	0	1	2	3	4
3. Je me sentais frustré(e), insatisfait(e) et en colère	0	1	2	3	4
4. J'avais peur pour ma propre sécurité	0	1	2	3	4
5. Je me sentais coupable	0	1	2	3	4
6. J'avais honte de mes émotions, ce que je ressentais	0	1	2	3	4
7. J'étais inquiet(e) pour la sécurité des autres (mes parents, mes frères et sœurs, mes copains, etc...)	0	1	2	3	4
8. J'avais l'impression de perdre le contrôle de mes émotions, de ne plus maîtriser ce que je ressentais	0	1	2	3	4
9. J'avais envie d'uriner (faire pipi), d'aller à la selle (faire caca)	0	1	2	3	4
10. J'étais horrifié(e), effrayé(e)	0	1	2	3	4
11. J'avais des sueurs, des tremblements, le cœur qui battait fort et vite (palpitations)	0	1	2	3	4
12. Je sentais que je pouvais m'évanouir	0	1	2	3	4
13. Je pensais que je pourrais mourir	0	1	2	3	4

FICHE DESCRIPTIVE

Nom	Peritraumatic Distress Inventory – Child (PDI-C)
Auteurs	Bui et al. (2011)
Traduction	Bui et al. (2011)
Type de d'évaluation	Questionnaire d'auto-évaluation
Âge	6 à 16 ans
Objectif	Mesurer les réactions de détresse émotionnelle au moment d'un événement traumatique et dans les minutes et les heures qui suivent
Descriptif	Ce type d'instrument administré dans un court délai suivant l'événement permet de mesurer la sévérité subjective de l'événement et d'identifier les personnes à risque de développer un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Ces personnes gagneraient à recevoir des traitements rapidement afin de diminuer la gravité et la durée des symptômes
Nombre d'items	13 items
Cotation	Echelle de Likert en 5 points allant de 0 (pas du tout vrai) à 4 (extrêmement vrai) Somme des items comprise entre 0 et 52
Seuil ou indication	Score total ≥ 15 permet le dépistage du dissociation péritraumatique significative
Temps de passation	15 min
Références	Bui, E., Brunet, A., Allenou, C., Camassel, C., Raynaud, J. P., Claudet, I., Fries, F., Cahuzac, J. P., Grandjean, H., Schmitt, L., & Birmes, P. (2010). Peritraumatic reactions and posttraumatic stress symptoms in school-aged children victims of road traffic accident. <i>General hospital psychiatry</i> , 32(3), 330–333.